

||||| Pireflor®

Insetticida specifico per la lotta delle cocciniglie e mosche bianche.

Pireflor® è un insetticida di contatto a base di piretrine naturali estratte dai capolini floreali di *Chrysanthemum cinerarifolium*.

Autorizzato su un ampio spettro di colture, può essere impiegato in qualsiasi stagione.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Piretrine pure 2% (18,61 g/l)	3 A	Concentrato Emulsionabile (EC)	 ATTENZIONE Registrazione n°: 10158 del 20/09/1999



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 380 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 480 L

Visita
la pagina
prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE MAX DI IMPIEGO		N. TRATTAMENTI	PHI (gg)	
		l/ha	ml/hl Volume di acqua (l/ha)			
ARANCIO, MANDARINO, LIMONE	Afidi Mosca bianca (Aleurodidi)	2,4	160 ml/hl fino a 1500 l/ha	3 Ogni 7 gg	1	
MELO, PERO	Afidi (<i>Aphis pomi</i>)				7	
PESCO, PRUGNO, CILIEGIO, ALBICOCCO	Afidi (<i>Myzus persicae</i>) <i>Drosophyla suzukii</i>				1	
VITE DA VINO* VITE DA TAVOLA*	Tignola (<i>Clysia ambiguella</i>) Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>) Cicaline (<i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasca vitis</i>)				1	
FRAGOLA (campo)	Tripidi <i>Drosophyla suzukii</i>	1,6	160 ml/hl fino a 1000 l/ha		3 Ogni 7 gg	2
LAMPONE, MIRTILLO, MORA	<i>Drosophyla suzukii</i>	1,28	160 ml/hl fino a 800 l/ha			
RIBES (campo)						
ORTAGGI A FOGLIA ERBE FRESCHE FIORI COMMESTIBILI (campo e serra)**	Afidi					
PATATA	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,96	160 ml/hl fino a 600l/ha		0	
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA (campo e serra)	Mosca bianca (<i>aleurodidi</i>) Tripidi	1,92	160 ml/hl fino a 1200l/ha		1	
ZUCCHINO	Afidi	1,28	160 ml/hl fino a 800 l/ha			
MELONE (campo)						
FLOREALI E ORNAMENTALI (campo e serra)	Afidi Tripidi Mosca bianca (<i>Aleurodidi</i>)	1,6	160 ml/hl fino a 1000 l/ha	2 Ogni 7 gg	n.r.	

* In caso di presenza di Flavescenza dorata, valutare se ripetere il trattamento in funzione del monitoraggio di *Scaphoideus titanus*

** Lattughe e insalate (Dolcetta/valerianella/gallinella, Lattughe, Scarola/indivia a foglie larghe, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (Spinaci, Portulaca/porcellana, Bietole da foglia e da costa), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga, Erbe fresche e fiori commestibili (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro/lauro, Dragoncello, Altri)

VANTAGGI

- Sostanza attiva di derivazione naturale.
- Ampio spettro d'azione.
- Ridotti tempi di carenza.
- **Consentito l'impiego in Agricoltura Biologica ai sensi della normativa vigente.**