

VITIEPEC F WG

Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili
Meccanismo d'azione: FRAC 27, M4

VITIEPEC F WG

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17940 del 7.03.2023

Composizione

Cimoxanil puro 8 g
Folpet puro 66 g
Coformulanti q. b. a 100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea; H319 -Provoca grave irritazione oculare; H332 – Nocivo se inalato; H351 - Sospettato di provocare il cancro; H361fd - Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto; H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini; P260 – Non respirare gli aerosol; P201 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVE-LENI/un medico. P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 - Raccogliere la fuoriuscita. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ASCENZA Italia S.r.l.
Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)
Tel. +39 0284944669

Stabilimenti di produzione:

ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 440 Setúbal (Portogallo)

Stabilimento di Ri-etichettatura:

Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Distribuito da: Corteva Agriscienze Italia s.r.l – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona

SIPCAM Italia S.p.A Strada Statale 33, 195, 20017 Rho

SUMITOMO Chemical Italia Via Caldera, 21, 20153 Milano

GOWAN Italia Via Giovan Battista Morgagni, 68, 48018 Faenza RA

DIACHEM S.p.A - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611

Manica S.p.a. via all'Adige 4 – 38068 Rovereto (TN) Tel. 0464 433705

Taglia: 0,150-1-6-12-15-25kg Partita n. vedi corpo della confezione



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare un'area non trattata di 20 metri che include una fascia di rispetto vegetata permanente non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali.

Per proteggere gli artropodi non-bersaglio non trattare in una fascia a bordo campo di 20 m dalle zone confinanti non coltivate.

Durante le operazioni di miscelazione/caricamento durante l'applicazione, indossare tuta di protezione da agenti chimici e guanti in nitrile.

Per applicazioni manuali e da automezzo indossare una semimaschera facciale con filtro P3 per le operazioni di miscelamento e caricamento. Per applicazioni manuali indossare una semimaschera facciale con filtro P3 per le operazioni di miscelamento/caricamento e irrorazione.

Rientrare nell'area trattata indossando guanti in nitrile e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

VITIPEC F WG è un fungicida in granuli idrodispersibili ad azione translaminare endoterapica e di contatto efficace contro la Peronospora della vite. VITIPEC F WG è una miscela di due principi attivi: Cymoxanil che possiede prontezza d'azione ed effetto bloccante e Folpet ad attività preventiva. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce polvere durante le operazioni di preparazione della soluzione antiparassitaria.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale. Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate, in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.

Vite da vino: contro Peronospora, applicare VITIPEC F WG alla dose di 1,5 kg/ha, diluito in 100-1000 litri di acqua; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni ed effettuare fino ad un massimo di 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni.

Vite da tavola: contro Peronospora, applicare VITIPEC F WG alla dose di 1,5 kg/ha, diluito in 100-1000 litri di acqua; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni ed effettuare fino ad un massimo di 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni.

Viti madre e vivai di vite: contro Peronospora, applicare VITIPEC F WG alla dose di 1,5 kg/ha, diluito in 100-1000 litri di acqua; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni ed effettuare fino ad un massimo di 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Il prodotto deve essere applicato preventivamente. È consigliabile alternare l'utilizzo di VITIPEC F WG con prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta per la Vite da vino e alla fine della fioritura per la Vite da tavola.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO