


**Fungicida sistemico in microemulsione ad ampio spettro.**

**Brek<sup>®</sup>** è un fungicida sistemico a base di Tetraconazolo, sostanza attiva dotata di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione. È un prodotto che consente di avere la massima protezione con la più ampia elasticità d'impiego in trattamenti di tipo sia preventivo che curativo. Può essere applicato ai diversi stadi della coltura, da solo o in miscela con altri prodotti, in funzione del programma dei trattamenti adottato.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Tetraconazolo puro 3,85% (40 g/L)	3 Gruppo G	Microemulsione (SE)	 Registrazione n°: 17680 del 11/08/2020



Sacchetto: 1 L  
 Cartone: 12x1 L  
 Pallet: 600 L



Accedi  
 all' **Etichetta**



**EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO**

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)	
FRUMENTO, ORZO	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> ) Ruggini ( <i>bruna, gialla, nera - Puccinia ssp.</i> ) Septoriosi ( <i>Septoria spp.</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	3 L/Ha	In condizioni favorevoli all'infezione dalla fase di botticella entro la fine della fioritura	1	fine fioritura	
	Barbabetola da Zucchero	Cercospora ( <i>Cercospora bieticola</i> ) Oidio ( <i>Erysiphe beta</i> ) Ramularia ( <i>Ramularia Beticola</i> ) Ruggine ( <i>Uromyces betae</i> )	2,5 L/Ha			Alla comparsa dei sintomi da fine sviluppo fogliare alla fase di pre-fioritura
VITE DA VINO	Oidio	625-750 mL/Ha	In pre e post fioritura	3 Ogni 10-14 gg	30	
VITE DA TAVOLA			-			
MELO, PERO	Oidio	625-750 mL/Ha	Primavera ed Estate	Ogni 10-14 gg	14	
	Ticchiolatura	750 mL/Ha	Dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione primaria fino alla fase di frutto noce	3 Ogni 7-10 gg		
PESCO, NETTARINE, PERCOCHE, ALBICOCCO	Oidio	1 l/Ha	Inizio fioritura	3 Ogni 10-14 gg	7	
MELONE, COCOMERO (campo e serra)		0,65-1,25 L/Ha	Alla comparsa dei primi sintomi	2-3 Ogni 7-12 gg		
CETRIOLO, ZUCCHINO (campo e serra)		1,25 L/Ha		3		
CARCIOFO	1 L/Ha	2-3 Ogni 7 gg		7		
PEPERONE, MELANZANA, POMODORO (campo)	Oidio	1-1,25 L/Ha	A seconda della pressione della malattia	2-3 Ogni 8-12 gg	3	
	Cladiosporiosi	1,25-1,87 L/Ha				
FRAGOLA	Oidio	0,6-1,25 l/Ha	Ruggine	3 Ogni 7 gg	1	
ROSA	Oidio Ruggine	125 mL/hL		235 mL/hL	Ogni 7-14 gg	-
CRISANTEMO	Ruggine	235 mL/hL				
GAROFANO						
PELARGONIO						
GLADIOLO						

(\*) Considerato l'elevato numero di varietà floricole ed ornamentali è consigliabile effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.